

40. 佐賀県 (Saga Pref.)

作成者: 古川雅通¹⁾; 協力者: 溝上誠司

作成日付: 2002年12月

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している 産地 (市町村)	現在減少傾向にある産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考(対策・文献など)
EN	ソ, ツ	E	オオウラギンヒョウモン	-	嬉野町, 相知町, 武雄市	基山町, 鳥栖市, 佐賀市, 小 城町, 多久市	1950年代は各地で普通. 相知町は1980年が最後 の記録. 武雄市は1982年が最後の記録	広大な草地の減少	-
EN	ソ, ツ	R	フジミドリシジミ	なし	鳥栖市	-	1985年以降の記録なし	不明	-
EN	ソ, ツ	E	タイワンツバメシジミ	なし	鎮西町	鳥栖市, 大和町, 小城町, 唐 津市, 大町町, 北波多村	1980年代より極めて減少	草地の宅地化, 農地化	-
VU	タ	-	ウラギンスジヒョウモン	なし	県内全域	-	1994年以降の記録なし	不明	-
VU	テ	R	ウラキンシジミ	-	鹿島市	-	-	伐採による食樹の消失	2002年10月, 発生地の一部が佐賀県自然環境 保全条例に基づく「多良岳県自然環境保全地域 (特別地区, 野生動植物保護地区)」に指定され, 指定種(原則として採集禁止)として本種があげら れている
VU	タ, テ	V	スギタニルリシジミ	-	太良町	-	1990年代前半より記録が減少	伐採による食樹(キハダ)の消失	-
NT	チ, ト	-	ツマグロキチョウ	嬉野町	佐賀市, 牛津町	-	佐賀市では1981年以降, 記録なし	食草(カワラケツメイ)の減少	-
NT	チ	R	エソスジグロシロチョウ	なし	基山町, 鎮西町, 肥前町	-	基山町では1974年の記録が最後であったが, 1994年に再確認された. その後の記録なし. 玄界 灘の島嶼では1990年以降の記録なし	不明	-
NT	チ	-	ヤマキマダラヒカゲ	-	鳥栖市, 脊振村, 三瀬村	なし	1990年代の記録は数例のみ	不明	-
NT	ト	R	アカシジミ	なし	鳥栖市, 三瀬村, 富士町, 小 城町, 浜玉町, 七山村	-	1990年代前半より記録が減少	コナラ, クヌギの伐採	-
NT	チ, ト	V	キリシマミドリシジミ	-	脊振村, 三瀬村, 太良町	-	太良町では1970年代後半の伐採により生息範囲 が縮小した	伐採による食樹の消失	-
NT	チ, ト	R	クロシジミ	-	鳥栖市, 小城町, 七山村	-	1990年代の記録は数例のみ	崖, 山道などの舗装による生息環境の破壊	-
NT	チ, ト	V	クロツバメシジミ	呼子町	唐津市	唐津市の一部	唐津市の一部の産地は2001年に消滅	宅地化による発生地の破壊	-

1) 〒849-0304 佐賀県小城郡牛津町下砥川784-1