

44. 宮崎県 (Miyazaki Pref.)

作成者: 岩崎郁雄¹⁾; 協力者: 三町美一郎・安本潤一

作成日付: 2003年1月

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している 産地 (市町村)	現在減少傾向にある産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考(対策・文献など)
EN	ク,ソ, ッ	EX	スジボソヤマキチョウ	-	高千穂町	西米良村, 宮崎市(偶産?)	20世紀初頭には,九州山地に少ないながら広く分布していたらしい.県内では1953年以後,正式な採集記録はないが,その後,大分県境の祖母山頂での目撃報告がある	宮崎県側の森林伐採による環境の悪化など	-
EN	ク,ソ, ッ	V	ウラギンシジロウモン	えびの市	延岡市, 北浦町	高千穂町, 北川町, 北方町, 日之影町, 門川町, 椎葉村, 高鍋町, 西米良村, 宮崎市, 田野町, 高岡町, 須木村, 小林市, 都城市, 南那珂地域	一度に見られる個体数は多くないものの,広く県内に分布していた.1980年代以降急速に減少した	オオウラギンシジロウモンと同じような環境に生息する	-
EN	オ,ソ, ッ	E	オオウラギンシジロウモン	えびの市	高千穂町	延岡市, 北川町, 北方町, 日之影町, 門川町, 椎葉村, 高鍋町, 西米良村, 宮崎市, 田野町, 高岡町, 高原町, 須木村, 小林市, 都城市, 南那珂地域	宮崎県内では広く分布していたが,1980年代後半以後,ほとんど絶滅してしまった.唯一,えびの市の自衛隊演習場の草原に多数残存している	農業形態の変化や圃場整備など,シバ型草原が急速に失われたことが最大の要因と思われる	-
EN	ク,ソ, ッ	V	ウラゴマダラシジミ	-	椎葉村, 高千穂町	五ヶ瀬町	宮崎県内では産地が極めて局所的である.現在生息していると推定される場所でも近年,情報が得られていない	五ヶ瀬町の産地は森林伐採など環境の変化のため絶滅したと思われる	-
EN	ク,ツ	V	オナガシジミ	-	椎葉村, 高千穂町, 五ヶ瀬町	-	宮崎県内ではウラゴマダラシジミよりも生息域はやや広いが,近年少なくなっている.五ヶ瀬町では絶滅に近い状態である	食樹のオニグルミが不要材として伐採されている.林道建設でもかなりのオニグルミが伐採されている	オニグルミ林の保護が必要である
EN	ク,ソ, ッ	E	ゴイシツバメシジミ	-	小林市	須木村?	1980年代前半までは,確実に生息していたが,急速に減少.1994年以後は,絶滅に近い状況にある	食草の生育する森林の大規模伐採	現在も生息していると推定される地域での生息調査と,食草の増殖等が考えられる
VU	ケ	R	ツマベニチョウ	日南市, 南郷町	-	-	太平洋戦争中からの記録がある.1993年の台風のため,食樹が消失,危機的状況にあったが,現在は復活している.ただし繁殖地はわずか2カ所である	食樹ギョボクの伐採等	日南海岸各地でギョボクの植栽が進んでいる
VU	ケ	R	ヒメシロチョウ	-	高千穂町	-	高千穂町の五ヶ所高原にのみ生息している	食草のツルフジバカマの分布が局所的で,草原も不安定である	-
VU	コ,テ	-	ミスジチョウ	椎葉村, 五ヶ瀬町, 高千穂町, 北川町	延岡市, 都農町, 木城町, 綾町, 国富町, 西都市, 西米良村, えびの市	-	いずれの産地でも個体数は少ない	樹林の伐採による	-
VU	カ,タ, テ	V	ル - ミスジシジミ	綾町, 須木村, 北郷町	木城町, 西米良村, 高岡町, 高原町, 都城市	小林市, 高城市, 山之口町	1930~1940年代には,それほど珍しくなかったようであるが,照葉樹林の伐採が続き,近年は極めて少なくなった	樹林の伐採による	-
VU	ケ,テ	R	ヒサマツミドリシジミ	綾町, 高原町, 都城市, 北郷町	延岡市, 椎葉村, 西米良村, 木城町, 都農町, 西都市, 国富町, 高岡町, 宮崎市, 須木村, 小林市, えびの市	-	各地の照葉樹林に広く分布していたと思われるが,相次ぐ伐採のため減少した	イチイガシ林の伐採	-
VU	ケ,テ	V	クロミドリシジミ	-	五ヶ瀬町, 高千穂町	-	宮崎県北西部のクヌギ林に生息しているが,産地は局所的である	椎茸材として,クヌギ林の更新が早くなっており,ある程度の樹齢木に依存する本種にとっては危機的である	-
VU	コ,タ, テ	R	クロシジミ	-	北浦町, 日之影町, 高千穂町, 五ヶ瀬町, 椎葉村, 西米良村, 綾町	延岡市, 宮崎市, 田野町	どの産地でも局所的で,見られなくなった産地も多い	-	-
VU	カ,シ, タ,テ	R	タイワンツバメシジミ	-	門川町, 佐土原町, 宮崎市, 田野町, 日南市, 都城市ほか	日之影町	1990年以前は各地で少なくなかったが,1994年を境に以後急激に減少している	路脇の草刈りをしなくなったことや,舗装化による食草の消失と干ばつの影響による	-
NT	チ,ト	-	オナガアゲハ	椎葉村, 五ヶ瀬町, 高千穂町, 西米良村など	宮崎市, 高鍋町, 川南町, 田野町, 延岡市	-	安定した産地は多いが,都市近郊では減少しつつある	主食樹のコクサギの減少	-
NT	チ,ト	-	エソスジグロシロチョウ	椎葉村, 五ヶ瀬町, 高千穂町, 日之影町	西米良村, 北方町, 延岡市	-	高千穂町では極めて多いが,他の産地では局所的	草地の減少,食草の消失	-
NT	チ,ト	-	ウラナミジャノメ	-	各地	-	産地はまだ多いが,いずれの所でも個体数は少ない	草地の減少	-
NT	チ,ト	-	ジャノメチョウ	霧島山, 五ヶ所高原, 椎葉村ほか	北方町, 北浦町, 延岡市	田野町?	海岸部, 県南部で減少.絶滅したところが多い	開発による草地の消失等	-
NT	チ,ト	R	オオウラギンシジロウモン	各地	田野町, 高岡町, 南那珂地域	宮崎市	1980年代以降減少している	農地開発,草原の減少	-

44. 宮崎県 (Miyazaki Pref.)

作成者: 岩崎郁雄¹⁾; 協力者: 三町美一郎・安本潤一

作成日付: 2003年1月

2

今回 ランク	判定 方法	前回 ランク	種 名	現在も安定して発生している 産地 (市町村)	現在減少傾向にある産地 (市町村)	絶滅したと考えられる産地 (市町村)	衰退の経過	減少要因	備考(対策・文献など)
NT	チ,ト	-	クモガタヒョウモン	九州山地,霧島山	南那珂地域	宮崎市	1980年代以降減少している	遷移進行	-
NT	チ,ト	-	ウラギンヒョウモン	霧島山,五ヶ所高原,椎葉村 ほか	日向市,延岡市ほか	南那珂地域,宮崎市	1980年代以降減少している	農地開発,草原の減少	-
NT	チ,ト	-	シ-タテハ	椎葉村,五ヶ瀬町,高千穂 町,西米良村	延岡市,宮崎市,山田町,串 間市,日南市	-	生息地は非常に局所的.環境変化の影響を受け やすい	食草を含む,森林伐採	-
NT	チ,ト	-	コムラサキ	-	各地	-	いずれの産地でも個体数が減少している	要因は不明だが,食樹の伐採もある	-
NT	チ,ト	R	オオムラサキ	椎葉村,西米良村ほか	野尻町,小林市,えびの市, 延岡市	-	分布南限付近の個体数が少なくなっている	食樹の伐採,河川改修	-
NT	チ,ト	-	ウラキンシジミ	北川町,高千穂町,日之影 町,五ヶ瀬町,椎葉村	都農町,延岡市,えびの市, 西米良村	須木村	-	森林の伐採	-
NT	チ,ト	R	アカシジミ	各地	延岡市,えびの市,都城市, 須木村	高鍋町	山間地では多いが,分布の周辺部では減少して いる	森林の伐採,吸蜜植物の減少	-
NT	チ,ト	-	ミズイロオナガシジミ	各地	延岡市,新富町,高鍋町,田 野町	-	都市近郊では見られなくなっている	クスギ林の伐採	-
NT	ト	-	アイノミドリシジミ	北川町,日之影町,高千穂 町,五ヶ瀬町,椎葉村,西米 良村	延岡市,都農町,えびの市, 須木村,西都市	-	-	森林伐採	-
NT	ト	-	メスアカミドリシジミ	日之影町,高千穂町,五ヶ瀬 町,椎葉村,西米良村,西都 市	延岡市,国富町	-	-	森林伐採	-
NT	サ,ト	-	キリシマミドリシジミ	九州山地,霧島山	徳蘇山系,鱈塚山	-	残存している産地は多いが,全体的には生息面 積が狭まっている	森林伐採	-
NT	サ, チ,ト	-	ウラジロミドリシジミ		五ヶ瀬町,高千穂町	-	高千穂町では減少している.五ヶ瀬町では最近 記録がない	ナラガシワの伐採	-
NT	サ,ト	R	フジミドリシジミ	大崩山-祖母山,国見山, 霧島山	掃部岳,尾鈴山,檜山	-	ブナ林の伐採により,生息面積が狭まっている	森林伐採	-
NT	チ,ト	-	カラスシジミ	各地	延岡市,北川町,北方町など	-	-	河川改修等による食樹の伐採	-
NT	ケ	R	ゴマシジミ	-	五ヶ所高原	-	宮崎県では,唯一の産地である	農地開発等	-
NT	チ,ト	-	シルビアシジミ	-	宮崎市,高岡町,田野町,清 武町,佐土原町,新富町,高 鍋町,木城町,高城町	串間市	河川敷など不安定な所に生息しているが,減少 傾向にある	草地の放置による遷移進行	-
NT	チ,ト	-	スギタニルリシジミ	各地	霧島山,山田町,宮崎市	-	低山地帯に分布の主力があるが,開発により激 減した所がある	大規模な伐採,ダムによる水没	-
NT	サ, チ,ト	-	ミヤマセセリ	各地	宮崎市,高岡町,田野町,延 岡市	-	安定した産地は多いが,都市近郊では減少して いる	生息地のクスギ・コナラ林の開発等	-
NT	チ,ト	R	ギンイチモンジセセリ	-	宮崎市,田野町,都城市,高 岡町,高鍋町,川南町,新富 町,佐土原町,えびの市	-	河川敷など連続的に発生している所もあるが,各 地で産地の減少が見られる	発生できるような草地の減少	-
NT	チ,ト	-	ミヤマチャバネセセリ	椎葉村,五ヶ瀬町,高千穂 町,西米良村など	宮崎市,高鍋町,川南町,田 野町,延岡市	-	各地で個体数は少ないが,広く分布している	草地の減少など	-

1) 〒880-0925 宮崎県宮崎市本郷北方4353-31